

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管して下さい。

【総合かぜ薬】 のどの痛み、かぜの諸症状の緩和に

# 布亀かぜゴールドカプセルA

布亀かぜゴールドカプセルAは、ゴオウ、ビタミンB<sub>1</sub>、B<sub>2</sub>をはじめとした9種類の有効成分が、かぜの諸症状に効果的に作用します。

## ⚠ 使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

#### 1. 次の人は服用しないでください。

(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人

(2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人

#### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬

等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー一用薬等)

#### 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。

(眠気等があらわれることがあります)

#### 4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。

#### 5. 服用前後は飲酒しないでください。

#### 6. 長期連用はしないでください。



### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 高齢者 (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

(5) 次の症状のある人：高熱、排尿困難 (6) 次の診断を受けた人：甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

5. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

6. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

7. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

8. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

9. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

10. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

11. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

12. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

13. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

14. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

15. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

ショック (アナフィラキシー) 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

皮膚粘膜眼症候群(ステイブス・ジョンソン症候群)、中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症 高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。

腎障害 発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。

肝機能障害 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

ぜんそく 息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

再生不良性貧血 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。

無顆粒球症 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

便秘、口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

5. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## ■効能・効果

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

## ■用法・用量

次の量を食後なるべく30分以内に服用してください。

年齢	1回量	服用回数
大人(15歳以上)	2カプセル	1日3回
7歳以上15歳未満	1カプセル	
7歳未満の幼児	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)定められた用法、用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲みこんだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)



## ■成分と作用

成分	6カプセル中	作用
アセトアミノフェン	900mg	発熱症状をしずめ、痛みをやわらげます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどのアレルギー症状をおさえます。
ジヒドロコデインリン酸塩	16mg	せきをしずめ、呼吸を楽にします。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	気管支を広げ、呼吸を楽にし、せきをしずめます。
グアヤコールスルホン酸カリウム	240mg	たんをやわらかくし、出しやすくします。
無水カフェイン	75mg	痛みをおさえる働きを助けるほか、頭痛をしずめます。
ビスイプチアミン(ビタミンB1誘導体)	24mg	かぜのときに消耗しやすいビタミンを補給します。
リボフラビン(ビタミンB2)	12mg	
ゴオウ	3mg	解熱、鎮静、鎮けい作用により、かぜの治りを早めます。

添加物として、ポビドン、タルク、カプセルに酸化チタン、黄色5号、ヒプロメロース、ラウリル硫酸ナトリウムを含有します。

<成分と作用に関連する注意>

本剤の服用により、尿が黄色になることがあります。これは本剤中のリボフラビン(ビタミンB2)によるもので、ご心配ありません。

## ■保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)配置期限(外箱に記載)をすぎた製品は服用しないでください。なお、配置期限内であっても開封後は6か月以内に服用してください。(品質保持のため)

## ■お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、下記にお願いいたします。

布亀株式会社 お客様相談室

TEL : (0798) 35-9985

受付時間:午前9:00~午後5:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

発売元 布亀株式会社  
兵庫県西宮市今津二葉町3番6号

製造販売元 新新薬品工業株式会社  
富山県富山市今市324番地