

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また必要なときに読めるよう大切に保管して下さい。

鎮咳祛痰剤 **ポリコデン錠** 第2類医薬品

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 過量服用・長期連用はしないでください

(倦怠感や虚脱感等があらわれることがあります。)

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)、鎮静薬

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気があらわれることがあります。)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 高齢者。
- (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (7) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
- (8) 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害



2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

(2) 5~6回服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

便秘、口のかわき

■効能・効果

せき、たん

■用法・用量

次の量を1日3回、食後に服用してください。

年 齢	1回量	服用回数
大人（15才以上）	4錠	1日3回
11才以上15才未満	2.5錠	
8才以上11才未満	2錠	
5才以上8才未満	1錠	
5才未満の幼児	服用しないこと	

〈用法及び用量に関連する注意〉

(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(2) 定められた用法、用量を厳守してください。

(3) 右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押しつけて裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。
(誤ってそのまま飲みこんだりすると食道粘膜に突き刺さる等、思わぬ事故につながる可能性があります。)



(PTPシートの取り出し図)

■成分・作用

成 分	12錠中	作 用
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	せき中枢にはたらい、せきをしずめます
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	気管支を拡張、呼吸を楽にし、せきをしずめます
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	くしゃみ、鼻みず、鼻づまり等のアレルギー症状をおさえます

添加物としてメタケイ酸アルミン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、乳糖水和物、カルメロースカルシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、赤色102号を含有します。

■保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)

(4) 配置期限(外装に記載)をすぎた製品は服用しないでください。

■お問い合わせ先

本剤につきましてのお問い合わせは、下記にお願いいたします。

布亀株式会社 お客様相談室

TEL : (0798) 35-9985

受付時間：午前9:00～午後5:00(土、日、祝日を除く)

発 売 元 布 亀 株 式 会 社
〒663-8585 兵庫県西宮市今津二葉町3番6号
製 造 販 売 元 新 新 薬 品 工 業 株 式 会 社
〒930-2221 富山県富山市今市324番地