

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

### 第3類医薬品

胃もたれ、消化促進に

バクセン<sup>®</sup>シリーズ

## 新新 DS 胃腸薬

「胃もたれ」は「加齢による胃の運動機能の低下、胃液分泌の減少」や「食べすぎ(特に脂もの)」などにより、胃の中に食物が長時間停滞することで起こります。

新新DS胃腸薬はその食物の消化を助ける作用、胃腸の機能を高める作用によって「最近、脂物を食べると胃がもたれる」「食べすぎで胃がもたれる、むかつく」という方にすぐれた効果を発揮する胃腸薬です。

### 特長

- 「胃もたれ」の解消にすぐれた効果を発揮します。
  - 強力な消化作用と、ウルソデオキシコール酸の脂肪の消化・吸収作用で、胃に溜まりやすい脂肪の消化力を特に高めてありますので、胃もたれ・消化不良にすぐれた効果を発揮します。
- 弱った胃腸の働きを回復させます。
  - 健胃生薬(センブリ・オウバク末)配合で、消化液(胃液、膵液等)の分泌を促進し、胃の運動機能を回復させますので、加齢などにより胃の機能が低下して、胃もたれを起こしやすい方にも効果的です。
- すぐれた消化作用を発揮します。

### ⚠使用上の注意



#### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
- 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 効 能

もたれ（胃もたれ）、はきけ（二日酔い・悪酔いのむかつき、胃のむかつき、むかつき、嘔気、悪心）、消化促進、胃弱、食べすぎ（過食）、飲みすぎ（過飲）、食欲不振（食欲減退）、消化不良、嘔吐、胃部・腹部膨満感、消化不良による胃部・腹部膨満感、胸つかえ、胸やけ



## 用法・用量

次の量を、食後に服用してください。

年 齢	1回服用量	1日服用回数
15歳以上	3錠	3回
11～14歳	2錠	
8～10歳	1.5錠	
5～7歳	1錠	
5歳未満の乳幼児	服用しないこと	

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 成分・分量

9錠中、次の成分を含みます。

成 分	含 量	は た ら き
ウルソデオキシコール酸	60mg	肝臓に働き、胆汁の分泌を促進し（利胆作用）、脂肪の消化・吸収を助けます。
膵臓性消化酵素TA	100mg	脂肪・たんぱく質・でんぷんに働いて、消化を助ける複合消化酵素です。
セ ン プ リ 末	27mg	生薬特有の苦みによって、弱った胃腸の働きを回復させ、食欲を増進させます。
オ ウ バ ク 末	300mg	

添加物として、乳糖水和物、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、合成ケイ酸アルミニウム、硬化油、ステアリン酸マグネシウム、香料を含有します。

## 保管および取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります）
- (4) びんのつめものは錠剤の破損を防ぐためのものです。開封後は取り除いてください。
- (5) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。



## 包 装

〔ビン入〕

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

新新薬品工業株式会社 CHC事業部 お客様相談室

T E L 076-435-0878

受付時間 9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931