

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品



■特 長

1. 胃粘膜の炎症をしずめ、修復し、保護します。

●アズレンスルホン酸ナトリウム、アルジオキサをはじめ、3種の粘膜修復剤が協力的に働いて、荒れた胃粘膜の炎症をしずめ、修復し、保護します。

●粘膜を保護する働きのある2種の制酸剤配合(ナトリウムフリータイプ)により、過剰な胃酸を中和しながら胃粘膜を保護し、胃酸から胃を守ります。

2. 「胃の痛み」「胃部不快感」などにすぐれた効果を発揮します。

3. 症状に合わせて空腹時(食間)あるいは食後に服用できる胃腸薬です。

⚠️使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。
透析療法を受けている人。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけてください。
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)
4. 長期連用しないでください。

👤 相談すること

1. 次の人は、服用前に医師または薬剤師に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 本人または家族がアレルギー体質の人。
(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(6) 次の症状のある人。
排尿困難
(7) 次の診断を受けた人。
腎臓病、心臓病、緑内障

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

(2) 2週間位服用しても症状がよくなる場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。

口のかわき、便秘、下痢

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

■効 能

- 胃痛、胃部不快感、胸やけ、胃重、げっぷ(おくび)、胃酸過多
- 胃部・腹部膨満感、もたれ(胃もたれ)、食欲不振(食欲減退)、胸つかえ、胃弱、食べすぎ(過食)、消化促進、消化不良による胃部・腹部膨満感、消化不良
- 飲みすぎ(過飲)、はきけ(二日酔・悪酔のむかつき)、胃のむかつき、むかつき、嘔気、悪心)、嘔吐

■用法・用量

次の量を、食間または食後に服用してください。

年 齢	1回服用量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1 包	3回
11~14歳	2/3包	
8~10歳	1/2包	
5~7歳	1/3包	
5歳未満の乳幼児	服用しないこと	



- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

■成分・分量

3包(3.6g)中、次の成分を含みます。

成 分	含 量	は た ら き
アズレンスルホン酸ナトリウム	6mg	カミツレという植物由来の成分で、胃粘膜に直接働いて炎症をしずめるとともに、損傷した胃粘膜組織を修復します。
アルジオキサ	300mg	胃粘膜組織を再生させ損傷部位を修復するとともに、荒れた胃粘膜表面に付着し、胃酸から胃粘膜を保護します。
カンゾウ粗エキス	150mg	荒れた胃粘膜を修復・保護するとともに、胃腸の過度の緊張をやわらげ胃の痛みをしずめます。
合成ヒドロタルサイト	1300mg	2種の刺激の少ない制酸剤配合により、過剰な胃酸を早く良く中和します。また、胃粘膜を保護する働きもあります。
ケイ酸アルミン酸マグネシウム	700mg	
ロートエキス3倍散	90mg	胃腸を支配している神経に働き、胃液の分泌を抑えるとともに、胃腸の過度の緊張をやわらげ胃の痛みをしずめます。
リパーゼA P 6	45mg	2種の消化酵素が、食物中の脂肪、でんぷん、たん白、せんい素に働いて、消化を助け、胃腸の負担を軽減します。
ビオチン	90mg	
ホップ乾燥エキス	50mg	2種の健胃生薬配合により、食欲の増進をはかるとともに、弱った胃腸の働きを回復させます。
ケイヒ末	520mg	

添加物として、カルメロースカルシウム、D-ソルビトール、ポビドン、トウモロコシデンプン、炭酸水素Na、L-アスパラギン酸Na、DL-アラニン、ヒドロキシプロピルセルロース、マクロゴール、L-メントール、香料を含有する。

■保管および取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

■包 装

〔スティック包装〕

常備薬として便利なA2胃腸薬錠もあります。

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。
新新薬品工業株式会社 CHC事業部 お客様相談室
TEL 076-435-0878
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931