

2013年3月改訂
(記載要領変更に伴う改訂)

使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

筋肉痛、関節痛、打撲・捻挫に

プロナインドメタシゲル1.0%

第2類医薬品 インドメタシン配合外用消炎鎮痛剤

プロナインドメタシゲル1.0%の特徴

- (1) インドメタシンが患部に直接浸透して、痛みの原因物質の生成を抑えます。
- (2) *l*-メントールのさわやかな清涼感が患部の痛みを和らげます。
- (3) のびがよく、べつつかないゲルタイプの製剤です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないでください
 - (1) 目の周囲、粘膜等。
 - (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
 - (3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。
3. 長期連用はしないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(裏面もご覧ください。)

効能・効果

筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、腱鞘炎（手、手首の痛み）、肘の痛み（テニス肘など）、打撲、捻挫

用法・用量

年 齢	使 用 方 法
11 歳 以 上	1 日 4 回 を 限 度 と し て 適 量 を 患 部 に 塗 擦 し て く だ さ い。
11 歳 未 満	使 用 さ せ 不 い で く だ さ い。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 11歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (5) 塗擦部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください。
- (6) 1週間あたり50gを超えて使用しないでください。
- (7) 使用後は手を洗ってください。

成分・分量(100g中)

成 分 名	分 量	は た ら き
インドメタシン	1.0g	痛みの原因物質の生成を抑えます。
ℓ-メントール	3.0g	さわやかな清涼感で患部の痛みを和らげます。

添加物として、プロピレングリコール、ラウロマクロゴール、ベンジルアルコール、クロタミトン、エタノール、パラオキシ安息香酸メチル、エデト酸ナトリウム水和物、カルボキシビニルポリマー、ジソプロパノールアミンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります）
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) メガネ、時計、アクセサリ等の金属類、化繊の衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- (6) 使用期限（チューブ及びケースに表示）を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先

新新薬品工業株式会社 お客様相談室

TEL：076-435-0878

受付時間 9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元 **新新薬品工業株式会社**

富山県富山市今市324番地 〒930-2221