

殺菌消毒薬

フタバダイア[®]軟膏S

第2類医薬品

(殺菌剤クロルヘキシジン塩酸塩配合)

「フタバダイア軟膏S」は、殺菌剤クロルヘキシジン塩酸塩のはたらきで傷口を殺菌・消毒する親水性の軟膏です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の人は使用しないでください

本剤又は本剤の成分、クロルヘキシジンによりアレルギー症状を起こしたことがある人。



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3) 患部が広範囲の人。
(4) 深い傷やひどいやけどの人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

- 5~6日間使用しても症状がよくなる場合も使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

【効能・効果】

切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒

【用法・用量】

1日数回患部にすり込むか、ガーゼに延ばして貼付する。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法を守ってください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)本剤は、外用にのみ使用し、内服しないでください。

【成分・分量】 (100 g 中)

成分名	分量	はたらき
クロルヘキシジン塩酸塩	0.2 g	殺菌剤 広範囲の細菌に対して殺菌作用を持っています。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	0.5 g	抗ヒスタミン剤 アレルギー反応によるかゆみを和らげます。
アラントイン	1.0 g	皮膚組織修復剤 損傷した皮膚組織の修復を促進します。

添加物として、ステアリルアルコール、軽質流動パラフィン、モノステアリン酸グリセリン、ミリスチン酸イソプロピル、アジピン酸ジイソプロピル、モノステアリン酸バチル、プロピレングリコール、モノステアリン酸ソルビタン、ポリオキシエチレンセチルエーテル、パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸メチル、エデト酸ナトリウム水和物を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4)配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先

新新薬品工業株式会社 お客様相談室

TEL: 076-435-1166 (代表)

受付時間 9:00~17:00 (土, 日, 祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元 **新新薬品工業株式会社**
富山県富山市今市324番地