

2008年8月改訂

この添付文書は、ご使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管しておいてください。

皮膚軟化剤

ピアソン[®]Sクリーム

第3類医薬品

かたい皮膚、ひび割れや荒れた手指にうるおいを与えるお肌の治療薬

ピアソンSクリームの特徴

「ピアソンSクリーム」は、角質軟化効果のある「尿素」を20%、これに血流改善効果をもつ「ビタミンE」と炎症を鎮める「グリチルリチン酸モノアンモニウム」を配合し、更に保湿因子や皮脂、細胞間脂質の成分を加えてクリーム基剤にも工夫をしています。

「ピアソンSクリーム」は、皮膚の水分保持能力を高め、硬くなった皮膚をやわらかくしますので、手指の荒れ、赤黒く硬くなるひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、乾燥してかゆくなる乾皮症、カサカサしたさめ肌に効果的です。

**使用上の注意****してはいけないこと**

〔守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなる〕

次の部位には使用しないでください

- (1) 目のまわり、粘膜等。
- (2) 引っかき傷等のきずぐち、亀裂（ひびわれ）部位。
- (3) かさぶたの様に皮膚がはがれているところ。
- (4) 炎症部位（ただれ・赤く腫れているところ）。

**相談すること****1. 次の方は使用前に医師または薬剤師に相談してください**

- (1) 今までに薬や化粧品等による刺激症状またはアレルギー症状（例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことのある方。
- (2) 医師による治療を受けている方。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、ぴりぴり感)、かさぶたのよう皮膚がはがれる状態

- (2) 2週間位使用しても症状がよくならない場合

[効能又は効果]

手指の荒れ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、老人の乾皮症、さめ肌

手の荒れ、乾燥した皮膚

しつとりうるおい肌



イメージ図

〔用法及び用量〕

1日数回、適量を患部にすりこんでください。

〔用法及び用量に関する注意〕

- (1) 定められた用法を守ってください。化粧品ではないので、顔面には使用しないでください。
- (2) 小児に使用させないでください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに、水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

〔成分及び分量〕 (本品 100 g 中)

成 分 及 び 分 量	配 合 成 分 の は た ら き
角質軟化剤 尿 素 20.0g	体内の水分を角質層に取り込むとともに、クリームの中の水分も吸収して保水量を増加します。
抗炎症剤 グリチルリチン酸モノアンモニウム 0.5g	炎症を修復しながら鎮めます。
血流改善剤 トコフェロール酢酸エステル 0.5g	血行を促進して皮膚の生まれ変わりを活発にします。
添加物として、ステアリン酸ポリオキシル40、自己乳化型モノステアリン酸グリセリン、精製大豆レシチン、乳酸、トリエタノールアミン、グリシン、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸ブチル、1,3-ブチレングリコール、ステアリン酸、セタノール、スクワラン、メチルポリシロキサン、グリセリン脂肪酸エステルを含有します。	

〔保管及び取り扱い上の注意〕



- (1) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (2) 直射日光の当たらない、なるべく涼しい所に密栓して保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。

〔消費者相談窓口〕



本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局、薬店または下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

新新薬品工業株式会社 お客様相談室

〒930-2221 富山県富山市今市324番地

電話番号 076-435-1166 (代表)

受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元 新新薬品工業株式会社 富山市今市324番地

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931