

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また必要なときに読めるよう大切に保管してください。

鎮咳祛痰剤 **ポリコデン錠** 第2類医薬品



使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)

2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作を



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 高齢者。(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(5) 次の症状のある人。高熱、排尿困難(6) 次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察

しないでください

(眠気等があらわれることがあります。)

- 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
- 過量服用・長期連用しないでください

を受けてください。

症状の名称	症状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘、口のかわき、眠気

- 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

■効能・効果

たん、せき

■用法・用量

次の量を1日3回、食後に服用してください。

年 齢	1回量	服用回数
大人（15歳以上）	4錠	1日3回
11歳以上15歳未満	2.5錠	
8歳以上11歳未満	2錠	
5歳以上8歳未満	1錠	
5歳未満の幼児	服用しないこと	

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 定められた用法、用量を厳守してください。
- (3) 12歳未満の小児には、医師の診療を受けさせることを優先してください。
- (4) 右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。（誤ってそのまま飲みこんだりすると食道粘膜に突き刺さる等、思わぬ事故につながります。）



(PTPシートの取り出し図)

■成分・作用

成 分	12錠中	作 用
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	せき中枢にはたらいて、せきをしずめます
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	気管支を上げ、呼吸を楽にし、せきをしずめます
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	くしゃみ、鼻みず、鼻づまり等のアレルギー症状をおさえます

添加物としてメタケイ酸アルミン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、セルロース、乳糖、カルメロースカルシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、赤色102号を含有します。

■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります）
- (4) 配置期限（外装に記載）をすぎた製品は服用しないでください。

■お問い合わせ先

本剤につきましてのお問い合わせは、下記にお願いいたします。

布亀株式会社 お客様相談室

TEL : (0798) 35-9985

受付時間：午前9:00～午後5:00（土、日、祝日を除く）

発 売 元 布 亀 株 式 会 社
兵庫県西宮市今津二葉町3番6号
製造販売元 新新薬品工業株式会社
富山県富山市今市324番地