

－医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。－

使用上の注意改訂のお知らせ

「ジヒドロコデインリン酸塩を含有する医薬品」

2019年2月4日

製造販売元：新新薬品工業株式会社

お客様各位

平素より弊社製品をご愛用いただき、厚く御礼申し上げます。

このたび、ジヒドロコデインリン酸塩を含有する医薬品の【使用上の注意】の一部が改訂となりました。

(厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長通知＜薬生安発 0704 第 1.2.3.6 号（2017 年 7 月 4 日付通知による）

弊社においては「布亀かぜゴールドカプセル A」、「鎮咳祛痰剤ポリコデン錠」の【用法用量】について下記の変更を行いました。「12 歳未満小児への使用禁忌」と変更になりました。ご使用の際にはご留意くださることをお願いいたします。

1. 該当製品 「布亀かぜゴールドカプセル A」

「鎮咳祛痰剤ポリコデン錠」

2. 改訂内容【用法・用量】

	変更後	変更前
布亀かぜゴールドカプセル A	<p>【用法・用量】</p> <p><u>大人(15 才以上) 1 回 2 カプセル</u></p> <p><u>12 才以上 15 才未満 1 回 1 カプセル</u></p> <p>いずれも 1 日 3 回、 食後なるべく 30 分以内に服用する。</p>	<p>【用法・用量】</p> <p>大人(15 才以上) 1 回 2 カプセル</p> <p>7 才以上 15 才未満 1 回 1 カプセル</p> <p>7 才未満の幼児服用しないこと</p> <p>いずれも 1 日 3 回、食後なるべく 30 分以内に服用する。</p> <p>12 才未満の小児には医師の診療優先</p>
鎮咳祛痰剤ポリコデン錠	<p>【用法・用量】</p> <p><u>大人 (15 才以上) 1 回 4 錠</u></p> <p><u>12 才以上 15 才未満 1 回 2.5 錠</u></p> <p>1 日 3 回食後に服用する。</p>	<p>【用法・用量】</p> <p>大人 (15 才以上) 1 回 4 錠</p> <p>11 才から 15 才未満 1 回 2.5 錠</p> <p>8 才以上 11 才未満 1 回 2 錠</p> <p>5 才以上 8 才未満 1 回 1 錠</p> <p>5 才未満の幼児には服用しないこと。</p> <p>1 日 3 回食後に服用する。</p> <p>12 才未満の小児には医師の診療優先</p>

以上

お問い合わせ先

電話 076-435-1166 新新薬品工業株式会社

平日（土、日、祝日を除く）9：00～17：00