



開封口

### 3つの有効成分がお肌にアプローチ



### かさつくお肌の治療薬

- のびがよく、ベタつきにくい水性クリームタイプ
- 本剤に尿素及びステロイド成分は配合していません
- 無香料・無着色



C108

**【効能・効果】**  
乾皮症、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、小児の乾燥性皮膚、手指の荒れ、手足のひび・あかぎれ、しもやけ(ただれを除く)、みず・やけどのあとの皮膚のしこり・つっぱり(顔面を除く)、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

**【用法・用量】**  
1日1～2回、適量を患部にすりこむか、又はガーゼなどにのびて貼ってください。(用法・用量に関連する注意)  
(1)定められた用法・用量を守ってください。  
(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。  
(3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。  
(4)本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。

**【成分・分量】(100g中)**  
ヘパリン類似物質0.3g、グリチルリチン酸二カルシウム0.5g、トコフェロール酢酸エステル0.5g含有  
添加物として、トリスオクタノールグリセリン、軽質流動パラフィン、スクワラン、パヘニルアルコール、マイクロクリスタリンワックス、シメチルポリシロキサン、ペンタステアリン酸テカグリセリル、ステアリン酸ポリオキシシル40、モノステアリン酸グリセリン、1,3-ブチレンジグリコール、カルボキシビニルポリマー、キサンタンガム、精製ヒアルロン酸ナトリウム、エト酸ナトリウム水和物、パラオキシ安息香酸メチル、水酸化ナトリウムを含有します。

**本剤に尿素及びステロイド成分は配合していません。**

**【保管及び取扱い上の注意】**  
(1)直射日光の当たらない涼しい所に密封して保管してください。  
(2)小児の手の届かない所に保管してください。  
(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)  
(4)メカネ、時計、アクセサリ等の金属類、化粧の衣類、プラスチック類、床や家具などの塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。  
(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度  
☎0120-149-931

第2類医薬品  
50g  
血行促進・皮膚保湿剤  
**ピアソンHP 水性クリーム EX**  
使用期限 製造番号

50A0524-1



## かさつくお肌の治療薬

# Piason HP

血行促進・皮膚保湿剤  
**ピアソンHP 水性クリーム EX**

### 【有効成分】

#### ヘパリン類似物質

グリチルリチン酸二カルシウム  
トコフェロール酢酸エステル配合

非ステロイド系  
無香料・無着色

50g  
第2類医薬品



販売名:ピアソンHP水性クリームEX  
第2類医薬品

使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

**△ 使用上の注意**

**⊗ してはいけないこと**  
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)  
1. 次の人は使用しないでください。  
出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病など)の人  
2. 次の部位には使用しないでください。  
(1)目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膈等)  
(2)出血のある傷口(血が止まりにくくなる場合があります)

**☎ 相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。  
(1)医師の治療を受けている人。  
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(3)湿潤やただれのひどい人。  
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなりません場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

製造販売元  
**新新薬品工業株式会社**  
富山県富山市今市324番地

お客様相談室 ☎076-435-0878  
受付時間 9:00～17:00  
(土、日、祝日を除く)